



人肾癌细胞

细胞代号: ACHN

细胞名称: 人肾癌细胞

细胞代次: P84

生长特性: 贴壁生长

特征特性: 该细胞 1979 年建系，源自一名 22 岁患有肾细胞腺癌的白人男性的胸腔积液。

干扰素可抑制该细胞的生长，该细胞多用于干扰素及其诱导剂的抗增殖研究。


传代比例: 1:3-4 (建议)，细胞达 80%汇合时进行传代

培养条件: MEM 基础培养基、10%FBS 100U/ml 双抗

传代方法: 细胞培养至 80-90%汇合时，加消化液 (0.25%胰酶含 0.03% EDTA) 2ml (T75 瓶加 5ml)，预洗倒掉，再加 1ml 消化液 (T75 瓶加 3ml) 消化，显微镜下观察至细胞完全脱离瓶壁分离成单个细胞后，加培养基混匀，1 瓶分成 3-6 瓶，每 T25 瓶加培养基 6-8ml、T75 瓶加培养基至 16-18ml，37℃ 5%CO₂ 孵箱培养。

冻存液: 常规培养基 20%FBS 5%DMSO

细胞图片:



备注: 1. 客户在收到细胞时，请首先观察培养瓶是否完好，培养液是否外渗，培养液是否混浊。如发现
有瓶破、渗漏、培养液混浊等问题，请在收到细胞后立即与我们联系并拍照把图片发给我们。

2. 收到细胞处理流程:

- a. 收到细胞后检查是否有运输问题
- b. 若无运输问题，请用 75%酒精消毒，拆下封口膜，放入培养箱中静置
- c. 严格检查培养箱参数



- d. 静置 12-24 小时后，细胞状态稳定后，即可开始操作
 - e. 选用我们推荐的培养基体系
 - f. 培养的前 3 天，需每天观察拍照，如有问题请及时反应
3. 如您收到细胞 3 天内没有反应，以后出现问题，不重发，客户操作造成污染的不重发
4. 可以重发的情况与判定标准：
- a. 细胞运输途中遭遇各种问题：细胞丢失、破损、漏液等，重发
 - b. 冻存细胞复苏后，绝大多数细胞未存活，重发
 - c. 存活的细胞静置 24 小时后，绝大多数细胞未存活，重发
 - d. 收到细胞未开封静置 24 小时后，出现污染，重发